Foxy G

SOLUZIONE PER TERRENI DIFFICILI

Consentito l'impiego in agricoltura biologica

Numero di registro dei fertilizzanti biologici

0035939/22

COMPOSIZIONE

Tipo di ammendante organico: Ammendante vegetale semplice non compostato

Contenuto in micorrize: . . 1%
Glomus mosseae,
Glomus intraradices

Contenuto in batteri della Rizosfera:. . . . . 10^2 UFC/g

Altri microrganismi presenti:
. . . . . 10^7 spore/g
Fusarium oxysporum

Trichoderma presenti:
. . . . . 10^7 spore/g
Trichoderma spp.

Assenza di OGM e di organismi patogeni

CARATTERISTICHE C.F.

pH . . . . . n.d.
Densità. . . . . n.d.
Colore . . . . . .Viola
Odore. . . . . .Trascurabile
Solubilità . . . . . .Insolubile

FORMULAZIONE

Granuli

CLASSIFICAZIONE

Nessuna

CONFEZIONI

Barattolo . . . . . .da 1 kg
Secchio . . . . . .da 8 kg
Secchio . . . . . .da 15 kg

Made in Italy

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI

L'impiego di miscele di funghi micorrizici determina il raggiungimento di un equilibrio a livello della rizosfera, che promuove una maggiore sanità a livello radicale. La composizione di FOXY G, non solo stimola lo sviluppo dell'apparato radicale delle colture, ma permette di preimmunizzare la zona del colletto, che risulta essere la più sensibile agli attacchi di patogeni, tra i quali tutte le forme virulente di *Fusarium*. La presenza nell'inoculo di un ceppo di *Fusarium* ipovirulento consente di sottrarre spazio vitale necessario a qualsiasi altra forma virulenta. Ciascuna coltura viene aggredita da una forma esclusiva di *Fusarium*, più o meno patogenica, ma le basi vitali del fungo rimangono le stesse e laddove si sviluppa un ceppo, difficilmente un altro ceppo può insediarsi.
FOXY G deve essere utilizzato preventivamente la dove si sono osservati, anche negli anni precedenti, problematiche di tipo fungino. Le spore delle forme più aggressive possono perdurare nel terreno anche per diversi anni, e anche in presenza di una corretta rotazione poliennale, il rischio di osservare dei focolai è sempre molto alto.

DOSI E MODI D'USO

Incorporare FOXY G al substrato di coltivazione o terreno prima della semina o del trapianto in modo uniforme. È consigliabile associare al momento della distribuzione anche BIOFERTI SOIL G al fine di ottenere una maggiore sinergia tra le varie componenti. Assicurare al momento della distribuzione una buona dose di sostanza organica per garantire la corretta attivazione di tutte le componenti dei prodotti.

- Florovivaismo, orticole e arometiche in vaso, crisantemo e ciclamino: miscelare al terriccio prima dell'invaso in ragione di 0.50-1 kg/m^3.
- Colture da reciso: 10-20 kg/ha, incorporare durante la preparazione del terreno.
- Prati e tappeti erbosi: 10-20 kg/ha, incorporare prima della semina o distribuire a spaglio all'emergenza.
- Coltura in serra (pomodoro, peperone, melanzana, zucchine, melone, anguria, cetriolo, finocchio, sedano, ravanello, lattughe e insalate, brassiche e spinacio, carciofo, basilico e aromatiche, fragole in suolo e fuori suolo): 1-2 kg/1000 m^2. Incorporare nel terreno prima del trapianto.
- Colture orticole di pieno campo (cipolla, aglio, pomodoro, patata, peperone, anguria, melone, zucchino, fragole, carciofo, asparago, brassiche): 10-20 kg/ha, in una sola applicazione al momento della preparazione del terreno o alla rincalzatura.

AVVERTENZE: FOXY G10 ha un granulo grande (2.5-3 mm), FOXY G20 ha granulo piccolo (0.8-1 mm) adatto al micro-granulatore. Determinare la granulometria migliore per la più corretta applicazione.