

PHARMASTERIL SPRAY

Disinfettante alcolico pronto all'uso

Dispositivo Medico CE 0476 CLASSE IIb

CLASSE CND D0799 NUMERO ISCRIZIONE REPERTORIO 1783643

Composizione:	Benzalconio cloruro g 0,040 Didecildimetilammonio cloruro g 0,060 Clorexidina digluconato g 0,050 Alcool isopropilico (F.U.I.) g 26,146 Alcool etilico (F.U.I.) g 30,020 Coformulanti, denaturanti E acqua deionizzata q.b. a g 100,00
Aspetto:	Liquido limpido lievemente paglierino
Profumo:	All'arancio
pH:	7,00 – 8,00
Biodegradabilità:	Oltre il 90%
Tossicità:	DL50 acuta orale ratto benzalconio cloruro: 445 mg/kg peso corporeo DL50 acuta orale ratto alcool isopropilico: 4700-5500 mg/kg peso corporeo DL50 acuta orale ratto clorexidina: 1260-1950 mg/kg peso corporeo.
Confezioni:	- Flacone da 1 lt in cartone da 12 flaconi con 2 pistole spruzzatrici. (Ulteriori pistole spruzzatrici possono essere fornite a parte).
Proprietà e Vantaggi:	Attività microbica L'associazione di vari principi attivi permette di ottenere un largo spettro d'azione che include gram +, gram -, lieviti, miceti, il Mycobacterium tuberculosis e virus (HIV-HBV-HCV: attività virucida in 1'). La veicolazione alcolica del principio attivo crea un sinergismo d'azione ed inoltre preserva il formulato da qualsiasi pericolo di contaminazione.
Indicazioni d'uso	<ul style="list-style-type: none"> - Con l'apposita pistola spruzzatrice nebulizzare PHARMASTERIL SPRAY su superfici ed oggetti in ragione di 40 ml di prodotto per m² trattato. Lasciare agire per almeno 2' e se necessario asciugare. Non risciacquare con acqua per mantenere un effetto residuale. - Disinfezione rapida di apparecchiature elettromedicali, riuniti odontoiatrici, fruste e sistemi rotanti (turbine).
Applicazioni:	Indicato presso Studi e Ambulatori medici dentistici, centri estetici e podologici.

Informazioni riservate a personale qualificato