



Whitch G

NATURAL MICROBIAL TECHNOLOGY



Numero di registro
dei fertilizzanti biologici

0045332/25

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI

COMPOSIZIONE

Tipo di ammendante organico:
Ammendante vegetale
semplice non compostato

Contenuto in micorrize: 1%

Contenuto in batteri della
Rizosfera: 10^{10} UFC/g

Assenza di OGM e di organismi
patogeni

CARATTERISTICHE C.F.

Colore Marroncino
Odore. Trascurabile
Solubilità Disperdibile

FORMULAZIONE

Granuli

CLASSIFICAZIONE

Nessuna

CONFEZIONI

Sacchetto. da 1 Kg
Sacco da 10 Kg

APPLICAZIONI



Made in Italy

Caratteristiche principali:

WHITCH G è un prodotto all'avanguardia basato su *Streptomyces griseus*, un attinomicete che colonizza attivamente la rizosfera. Grazie alla produzione naturale di metaboliti secondari bioattivi, **WHITCH G** sostiene la salute delle piante favorendone una crescita vigorosa e proteggendole da stress biotici e abiotici. Questa azione lo rende particolarmente efficace nel supportare le colture anche in condizioni difficili, potenziandone la resilienza e garantendo una produttività ottimale in modo naturale e sostenibile. Con la sua capacità unica di integrare molteplici benefici, **WHITCH G** rappresenta una soluzione ideale per migliorare la salute del suolo e delle colture, promuovendo un'agricoltura più resiliente ed equilibrata.

Meccanismo d'azione

L'azione di **WHITCH G** si basa su una combinazione di meccanismi complementari che supportano lo sviluppo delle piante. *Streptomyces griseus* stimola la sintesi di ormoni vegetali come auxine e citochinine, influenzando positivamente la crescita e il vigore complessivo delle colture. Inoltre, migliora l'adattamento delle piante agli stress ambientali, contribuendo a mantenerle produttive anche in condizioni difficili. Un altro aspetto fondamentale è il rafforzamento del sistema immunitario delle piante: attraverso l'attivazione di processi naturali, **WHITCH G** rende le piante più resistenti a malattie e parassiti, migliorandone la capacità di rispondere efficacemente agli attacchi esterni.

MODALITÀ DI IMPIEGO

- Localizzato o distribuito uniformemente: 10 Kg/ha
- Mescolato al substrato di coltivazione: 100/200 g/m³